

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

# REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

BULLETIN nº 92 du 20 OCTOBRE 1989 DLP 23-10-89123513

COLZA

: Grosses altises

: situation stationnaire.

Charançon du bourgeon terminal : vol parfois important.

Pucerons

. : fortes populations.

CEREALES

: Pucerons : intervenir dès le seuil atteint.

Maladies : situation.

LUZERNE

: Apions

: dégâts généralisés.

TOUTES CULTURES

: Limaces.

## COLZA

Stade variable selon les situations 2 à 8 feuilles vraies.

#### GROSSES ALTISES

#### Situation:

Toujours quelques captures mais activité réduite.

### Préconisation :

de traitement justifié Pas traitement à ce stade. Un éventuel contre le charançon bourgeon terminal pourra contribuer à éliminer les adultes encore présents.

## CHARANCON du BOURGEON TERMINAL

#### Situation:

parfois captures, Nouvelles importantes depuis le week-end dernier.

rappelons qu'il Nous pas relation évidente n'existe de entre le nombre de captures cuvette jaune et les dégâts ; il est donc très difficile de prévoir le niveau de dégâts de ce ravageur.

Etat des captures dans quelques secteurs au 18/10 :

| Lieu                         | Date | Nbre captures   |
|------------------------------|------|-----------------|
| Ville/Terre (10)             | 16   | 8 dt 3 femelles |
| St Germain (10)              | 16   | 9 dt 2 femelles |
| Crugny (51)                  | 16   | 2               |
| Les Rivières<br>Henruel (51) | 16   | 0               |
| Avaux (08)                   | 16   | 0               |
| Attigny (08)                 | 16   | 0               |
| Rupt (52)                    | 16   | 3               |
| .2º Da sh sain               | 17   | 15              |
| Vallerest (52)               | 16   | 15              |
| Liffol Petit (52)            | 14   | 5               |
|                              | 16   | 7               |
| Crenay (52)                  | 17   | 2               |

### Préconisation :

La lutte vise les adultes avant qu'ils ne pondent dans les pétioles. Intervenir dans secteurs où des captures ont été enregistrées.

# **PUCERONS**

# Situation:

développement des colonies de pucerons est noté dans beaucoup secteurs. Outre le puceron

REIMS

Publication périodique ABONNEMENT ANNUEL: 190F

Ministère de l'Agriculture Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt Service Régional de la Protection des Végétaux 62, avenue Nationale - La Neuvillette B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX

Téléphone: 26.09.06.43

cendré, des infestations de pucerons verts (genre Myzus) sont observées dans certaines parcelles.

# Préconisation :

Lors de fortes pullulations ou dans le cas de cultures de colza mal implantées (sols motteuxséchants...), une intervention se justifie.

# **CEREALES**

ORGE : semis en cours à stade

4 feuilles.

BLE : stade levée à stade 3 feuilles.

# **PUCERONS**

### Situation :

Après ralentissement un vol début de la semaine dernière, d'activité note une reprise des pucerons depuis le 15 octobre. Les comptages au champ montrent des infestations de l'ordre 3 à 20 % de pieds touchés au niveau des blés et de l'ordre de 10 à 80 % de pieds touchés au niveau des orges.

Les nouveaux tests virologiques réalisés révèlent des taux d'infection des orges de l'ordre de 40 %, soit une légère diminution par rapport aux précédents tests.

### Préconisation :

Compte-tenu du pouvoir virulifère important des pucerons cette année, intervenir dès que le seuil de 10 à 15 % des pieds sont colonisés par au moins un puceron.

#### MALADIES

### Situation :

Les premiers symptômes d'oïdium sont visibles sur blé (Aube) et orge (Haute-Marne).

### Préconisation :

Aucune intervention n'est justifiée.

#### LUZERNE

#### APIONS

#### Situation:

Contrairement aux deux dernières années, les adultes d'apions ont pondu très tôt (fin août) au niveau des bourgeons de luzerne. On constate donc à l'heure actuelle, un grand nombre de bourgeons abritant une larve de ce coléoptère.

#### Préconisation :

Aucune expérimentation n'a mis en évidence l'efficacité d'un insecticide au stade larvaire du parasite.

Toute intervention est déconseillée Seule une coupe tardive ou un hiver rigoureux permet de détruire une partie des larves d'apions.

## TOUTES CULTURES

#### LIMACES

# Situation :

Des dégâts sont constatés aussi bien sur colza que sur blé et orge. Le retour d'une période pluvieuse doit nous inciter à surveiller les pièges et à vérifier leur présence dans les semis de céréales.

#### Préconisation :

Intervenir dès les premiers dégâts avec les hélicides actuels.

RECTIFICATIF ANTIGRAMINEES SUR COLZA : AGIL de la Société La Quinoléïne contrôle bien les levées automnales de folle-avoine.

VOUS VOULEZ ETRE INFORMES ENCORE PLUS RAPIDEMENT!

Il est encore temps de vous abonner à TEL-SPV (système boxtel).

